

Aufgaben 13 Anwendungen der Differentialrechnung Lokale/Globale Maxima/Minima, Wendepunkte

Lernziele

- die lokalen Maxima und Minima einer Funktion bestimmen können.
- die Wendepunkte einer Funktion bestimmen können.
- das globale Maximum und das globale Minimum einer Kosten-, Ertrags- und Gewinnfunktion bestimmen können.
- das globale Minimum einer Durchschnittskostenfunktion bestimmen können.

Aufgaben

13.1 Bestimmen Sie alle Stellen, an welchen die gegebene Funktion ...

- i) ... ein lokales Maximum hat.
 ... ein lokales Minimum hat.
- ii) ... einen Wendepunkt hat.
- a) $f(x) = x^2 - 4$
- b) $f(x) = -8x^3 + 12x^2 + 18x$
- c) $s(t) = t^4 - 8t^2 + 16$
- d) $f(x) = x e^{-x}$
- e) * $f(x) = (1 - e^{-2x})^2$
- f) * $V(r) = -D \left(\frac{2a}{r} - \frac{a^2}{r^2} \right) \quad (D > 0, a > 0)$

13.2 Angenommen, der Gesamtgewinn bei der Herstellung und dem Verkauf einer Ware beträgt

$$G(x) = (2000x + 20x^2 - x^3) \text{ CHF}$$

wobei x die verkaufte Stückzahl ist.

Bestimmen Sie die Stückzahl x bei maximalem Gewinn, und bestimmen Sie den maximalen Gewinn.

Hinweise:

- Bestimmen Sie zuerst die lokalen Maxima.
- Prüfen Sie dann nach, ob eines der lokalen Maxima das globale Maximum ist.

13.3 Angenommen, die Gesamtkosten für eine Dienstleistung eines Transport- und Logistik-Unternehmens sind gegeben durch

$$K(x) = \left(\frac{1}{4}x^2 + 4x + 100 \right) \cdot 100 \text{ CHF}$$

wobei x ein Mass für den Umfang der Dienstleistung ist.

Bestimmen Sie den Wert für x , welcher zu minimalen Durchschnittskosten führt.

Bestimmen Sie auch diese minimalen Durchschnittskosten.

13.4 Angenommen, die Produktionskapazität für eine bestimmte Ware kann 30 nicht überschreiten. Der Gesamtgewinn dieser Firma ist

$$G(x) = (4x^3 - 210x^2 + 3600x) \text{ CHF}$$

wobei x die verkaufte Stückzahl ist.

Bestimmen Sie die Stückzahl x , welche den Gewinn maximiert.

13.5 Angenommen, der jährliche Gewinn eines Geschäfts ist gegeben durch

$$G(x) = (-0.1x^3 + 3x^2) \cdot 1000 \text{ CHF}$$

wobei x die Anzahl Jahre nach 2010 ist.

Bestimmen Sie den Wendepunkt für den Gewinn.

13.6 Entscheiden Sie, welche Aussagen wahr oder falsch sind. Kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an.
In jeder Aufgabe a) bis c) ist genau eine Aussage wahr.

a) Falls f ein lokales Maximum bei x_0 hat, kann gefolgert werden, dass ...

☐

... $f(x_0) > f(x)$ für jedes $x \neq x_0$

☐

... $f(x_0) > f(x)$ für jedes $x > x_0$

☐

... $f(x_0) > f(x)$ für jedes $x < x_0$

☐

... $f(x_0) > f(x)$ für alle x in einer gewissen Umgebung von x_0

b) Falls $f(x_0) < 0$, $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) \neq 0$, kann gefolgert werden, dass f ...

☐

... kein lokales Minimum bei x_0 hat.

☐

... kein lokales Maximum bei x_0 hat.

☐

... keinen Wendepunkt bei x_0 hat.

☐

... einen Wendepunkt bei x_0 hat.

c) Das globale Maximum einer Funktion ...

☐

... ist immer ein lokales Maximum.

☐

... kann ein lokales Minimum sein.

☐


... kann ein lokales Maximum sein.

☐

... existiert immer.

Lösungen

13.1 a) $f(x) = x^2 - 4$



$$f'(x) = 2x$$

$$f''(x) = 2$$

$$f'''(x) = 0$$

i) $f'(x) = 0$ bei $x_1 = 0$

$$f''(x_1) = 2 > 0$$

$\Rightarrow$


lokales Minimum bei $x_1 = 0$
kein lokales Maximum

ii) $f''(x) = 2 \neq 0$ für alle x

$\Rightarrow$

kein Wendepunkt

b) $f(x) = -8x^3 + 12x^2 + 18x$



$$f'(x) = -24x^2 + 24x + 18$$

$$f''(x) = -48x + 24$$

$$f'''(x) = -48$$

i) $f'(x) = 0$ bei $x_1 = -\frac{1}{2}$ und $x_2 = \frac{3}{2}$

$$f''(x_1) = 48 > 0$$

$\Rightarrow$

lokales Minimum bei $x_1 = -\frac{1}{2}$


$$f''(x_2) = -48 < 0$$

$\Rightarrow$

lokales Maximum bei $x_2 = \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad f''(x) &= 0 \text{ bei } x_3 = \frac{1}{2} \\ f'''(x_3) &= -48 \neq 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{Wendepunkt bei } x_3 = \frac{1}{2}$$


c) $s(t) = t^4 - 8t^2 + 16$



$$\begin{aligned} s'(t) &= 4t^3 - 16t \\ s''(t) &= 12t^2 - 16 \\ s'''(t) &= 24t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad s'(t) &= 0 \text{ bei } t_1 = 0, t_2 = -2 \text{ und } t_3 = 2 \\ s''(t_1) &= -16 < 0 & \Rightarrow & \text{lokales Maximum bei } t_1 = 0 \\ s''(t_2) &= 32 > 0 & \Rightarrow & \text{lokales Minimum bei } t_2 = -2 \\ s''(t_3) &= 32 > 0 & \Rightarrow & \text{lokales Minimum bei } t_3 = 2 \\ \text{ii)} \quad s''(t) &= 0 \text{ bei } t_4 = -\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ und } t_5 = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ s'''(t_4) &= -\frac{48}{\sqrt{3}} \neq 0 & \Rightarrow & \text{Wendepunkt bei } t_4 = -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ s'''(t_5) &= \frac{48}{\sqrt{3}} \neq 0 & \Rightarrow & \text{Wendepunkt bei } t_5 = \frac{2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$


d) $f(x) = x e^{-x}$



$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{-x} - x e^{-x} = (1 - x) e^{-x} \\ f''(x) &= -e^{-x} - (1 - x) e^{-x} = (x - 2) e^{-x} \\ f'''(x) &= e^{-x} - (x - 2) e^{-x} = (3 - x) e^{-x} \end{aligned}$$

- i) $f'(x) = 0$ bei $x_1 = 1$
 $f''(x_1) = -\frac{1}{e} < 0 \Rightarrow$ lokales Maximum bei $x_1 = 1$
 kein lokales Minimum
- ii) $f''(x) = 0$ bei $x_2 = 2$
 $f'''(x_2) = \frac{1}{e^2} \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkt bei $x_2 = 2$

e) * $f(x) = (1 - e^{-2x})^2 = 1 - 2e^{-2x} + e^{-4x}$



$$f'(x) = 4e^{-2x} - 4e^{-4x} = 4e^{-2x}(1 - e^{-2x})$$

$$f''(x) = -8e^{-2x} + 16e^{-4x} = 8e^{-2x}(2e^{-2x} - 1)$$

$$f'''(x) = 16e^{-2x} - 64e^{-4x} = 16e^{-2x}(1 - 4e^{-2x})$$

- i) $f'(x) = 0$ bei $x_1 = 0$
 $f''(x_1) = 8 > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum bei $x_1 = 0$
 kein lokales Maximum
- ii) $f''(x) = 0$ bei $x_2 = \frac{\ln(2)}{2} = 0.34\dots$
 $f'''(x_2) = -8 \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkt bei $x_2 = 0.34\dots$

f) * $V'(r) = -D \left(-\frac{2a}{r^2} + \frac{2a^2}{r^3} \right) = \frac{2aD}{r^2} \left(1 - \frac{a}{r} \right)$
 $V''(r) = -D \left(\frac{4a}{r^3} - \frac{6a^2}{r^4} \right) = \frac{2aD}{r^3} \left(\frac{3a}{r} - 2 \right)$
 $V'''(r) = -D \left(-\frac{12a}{r^4} + \frac{24a^2}{r^5} \right) = \frac{12aD}{r^4} \left(1 - \frac{2a}{r} \right)$

- i) $V'(r) = 0$ bei $r_1 = a$
 $V''(r_1) = \frac{2D}{a^2} > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum bei $r_1 = a$
 kein lokales Maximum
- ii) $V''(r) = 0$ bei $r_2 = \frac{3a}{2}$
 $V'''(r_2) = -\frac{64D}{81a^3} \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkt bei $r_2 = \frac{3a}{2}$

13.2 (Einziges) **lokales** Maximum bei $x_1 = \frac{100}{3} \rightarrow 33$ oder 34

$$G(33) = 51'843 \text{ CHF}$$

$$G(34) = 51'816 \text{ CHF}$$

$G(x) < G(x_1)$ falls $x \neq x_1$, da es kein lokales Minimum gibt

$\Rightarrow G = 51'843 \text{ CHF}$ ist der **globale** maximale Gewinn bei $x = 33$.

- 13.3 $\bar{K}(x) = \frac{K(x)}{x} = \left(\frac{1}{4}x + 4 + \frac{100}{x}\right) \cdot 100 \text{ CHF}$
 $\bar{K}(x)$ hat ein (einziges) **lokales** Minimum bei $x_1 = 20$.
 $\bar{K}(20) = 1400 \text{ CHF}$
 $\bar{K}(x) > \bar{K}(x_1)$ falls $x \neq x_1$, da es kein lokales Maximum gibt.
 $\Rightarrow \bar{K} = 1400 \text{ CHF}$ sind die **globalen** minimalen Durchschnittskosten bei $x = 20$.
- 13.4 $G(x)$ hat ein **lokales** Maximum bei $x_1 = 15$ und ein **lokales** Minimum bei $x_2 = 20$.
 $G(x_1) = 20'250 \text{ CHF}$
 $G(x) < G(x_1)$ falls $x < x_1$, da es kein lokales Minimum auf dem Intervall $x < x_1$ gibt.
 $G(30) = 27'000 \text{ CHF} > 20'250 \text{ CHF} (!)$
 $\Rightarrow G = 27'000 \text{ CHF}$ ist der **globale** maximale Gewinn am Endpunkt $x = 30$.
- 13.5 $G(x)$ hat einen Wendepunkt bei $x_1 = 10$.
 $G(10) = 200 \cdot 1000 \text{ CHF} = 200'000 \text{ CHF}$
 $\Rightarrow$ Wendepunkt (10 | 200'000 CHF), d.h. wenn $x = 10$ (im Jahr 2020) und $G = 200'000 \text{ CHF}$
- 13.6 a) 4. Aussage
b) 3. Aussage
c) 3. Aussage