

Übung 12 **Fourier-Transformation** **Bestimmung der Fourier-Transformierten**

Lernziele

- die Fourier-Transformierte einer einfacheren aperiodischen Funktion von Hand und mit Hilfe von Integraltafeln bestimmen können.
- mit Hilfe des Computerprogrammes MAPLE die Fourier-Transformierte einer aperiodischen Funktion bestimmen können.

Aufgaben

1. Gegeben ist die aperiodische Funktion $x(t)$.
 - i) Skizzieren Sie den Grafen von $x(t)$.
 - ii) Bestimmen Sie die zu $x(t)$ gehörige Fourier-Transformierte $X(\omega)$ von Hand und mit Hilfe von Integraltafeln.
 - iii) Skizzieren Sie den Grafen von $X(\omega)$.
 - iv) Skizzieren Sie den Grafen des Betrages $|X(\omega)|$ von $X(\omega)$.

$$a) \quad x(t) = \begin{cases} 1 & (|t| < T_1) \\ 0 & (|t| > T_1) \end{cases} \quad (T_1 > 0)$$

$$b) \quad x(t) = e^{-a|t|} \quad (a > 0)$$

$$c) \quad x(t) = e^{-a|t|} \quad (a < 0)$$

2. Erstellen Sie mit dem Computerprogramm **MAPLE** ein File, mit welchem die Fourier-Transformierte $X(\omega)$ einer aperiodischen Funktion $x(t)$ bestimmt werden kann.

Das MAPLE-File sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Wahl einer beliebigen aperiodischen Funktion $x(t)$ durch den Anwender
- Aufzeichnen des Grafen von $x(t)$
- Berechnung der Fourier-Transformierten $X(\omega)$
- Berechnung von Betrag $|X(\omega)|$ und Argument $\arg(X(\omega))$ der Fourier-Transformierten
- Aufzeichnen der Grafen von Betrag $|X(\omega)|$ und Argument $\arg(X(\omega))$ der Fourier-Transformierten
- (evtl. weitere von Ihnen formulierte Anforderungen)

Lösungen

1. a) i) ...
- ii) $X(\omega) = \frac{2 \sin(\omega T_1)}{2T_1} \quad (\omega \neq 0)$
 $= 2T_1 \operatorname{sinc}(\omega T_1) \quad (\omega = 0)$ mit $\operatorname{sinc}(x) := \frac{\sin(x)}{x} \quad (x \neq 0)$
 $1 \quad (x=0)$
- iii) ...
- iv) $|X(\omega)| = \begin{matrix} X(\omega) & | & | & \frac{2}{T_1} & | & | & \frac{3}{T_1} & \frac{4}{T_1} & | & | & \frac{5}{T_1} & \dots \\ -X(\omega) & & & \frac{2}{T_1} & & & \frac{3}{T_1} & & & & \frac{4}{T_1} & \dots \end{matrix}$
- b) i) ...
- ii) $X(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
- iii) ...
- iv) $|X(\omega)| = X(\omega)$
- c) $x(t)$ besitzt keine Fourier-Transformierte.

2. Ein MAPLE-Muster-File finden Sie unter:
<http://www.tel.fh-htwchur.ch/~borer> Mathematik Unterlagen (...)